Thomas Spranz-Fogasy (Mannheim)

Fragen und ihre Funktionen in psychotherapeutischen Gesprächen¹

1 Einleitung und Überblick

Fragen im psychotherapeutischen Kontext zu untersuchen, ist aus psychotherapeutischer Sicht fragwürdig. Elina Weiste und Anssi Peräkylä, Letzterer einer der führenden konversationsanalytischen Forscher zu psychotherapeutischen Gesprächen und selbst ausgebildeter Therapeut, zitieren aus einer Untersuchung von Elliot et al. aus dem Jahr 1982 folgende Einschätzung: »interpretation and advice are the most helpful and question the least helpful type of therapist intervention« (Weiste und Peräkylä 2015: 2). Dieses Diktum leitet sich her aus der Annahme, Fragen seien durch den mit ihnen verbundenen Antwortzwang in einem so sensiblen Beziehungskontext viel zu invasiv und würden Patienten daher in ihrer Bereitschaft, über ihre seelischen Nöte zu sprechen, eher blockieren. Man könnte hier also eigentlich aufhören, weiter zu forschen.

Unterschätzt wird aber in der Forschung zu psychotherapeutischen Gesprächen das interaktionale und kognitive Potenzial von Fragen, das Wilhelm Köller so beschreibt:

Fragen leiten hypothetische Vorstellungsprozesse ein, die eine immanente Tendenz haben, in Selbstreflexionsprozesse überzugehen. Fragen helfen uns, Wissensdefizite zu lokalisieren, Wissensbedürfnisse zu thematisieren, Interessen für Ursachen und Funktionen zu artikulieren, Bezüge zur Vergangenheit sowie Zukunft herzustellen [...]. Fragen setzen einerseits immer Erfahrungen voraus, sie sind andererseits aber auch dazu bestimmt, neue Erfahrungen zu ermöglichen, weil sie einen Wechsel von Sehepunkten und Wahrnehmungsperspektiven beinhalten. (Köller 2004: 662)

1 Der Beitrag entstammt einer Forschungskooperation des Instituts für Deutsche Sprache (Mannheim) mit der Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik in Heidelberg. Ich danke Professor Christoph Nikendei für die Möglichkeit, den Beitrag auf der Grundlage gemeinsamer Arbeiten publizieren zu können. Im Beitrag wird eine Reihe gemeinsamer Publikationen aufgeführt und für die spezifische Fragestellung genutzt.

Wie ich später zeigen werde, gibt es auch spezifisch linguistische Gründe, Fragen in psychotherapeutischen Gesprächen mit Erkenntnisgewinn zu untersuchen. Ich möchte zuvor aber noch in gebotener Kürze die Geschichte der linguistischen und gesprächsanalytischen Forschung zu psychotherapeutischen Gesprächen skizzieren, um den Forschungskontext deutlich zu machen. Daran anschließend werden die dem Beitrag zugrundeliegende Daten und die Vorgehensweise dargestellt, bevor die zentralen psychotherapeutischen Sprachhandlungen und ihre Funktionen zunächst allgemein und dann fokussiert auf Fragen vorgestellt werden. Im letzten Abschnitt werden dann die Leistungen der verschiedenen Fragefunktionstypen im Zusammenhang diskutiert.

2 Geschichte und Forschungsstand der linguistischen Psychotherapieforschung²

Als Geburtsstunde der Psychotherapie gelten Freuds und Breuers *Studien zur Hysterie* von 1895. Die Autoren stellen darin u. a. auch das Aufbrechen von Patientenwiderstand durch gezielte therapeutische Interventionen dar, wodurch Linderung der Krankheitssymptome erzielt werden könne:

Man beginnt damit, den Kranken erzählen zu lassen, was er weiß und erinnert, wobei man bereits seine Aufmerksamkeit dirigiert und durch Anwendung der Druckprozedur leichtere Widerstände überwindet. Jedesmal, wenn man durch Drücken einen neuen Weg eröffnet hat, darf man erwarten, dass der Kranke ihn ein Stück weit ohne Widerstand fortsetzen wird. (Freud und Breuer 1895: 257)

Die heilende Wirkung von »sprachlichen Drückhandlungen« ist mittlerweile durch zahlreiche empirische Studien zur psychodynamischen Veränderung nachgewiesen, und es werden darin gezielte therapeutische Sprachhandlungen dafür verantwortlich gemacht (siehe Kabatnik et al. 2019). Sprachliche Intervention gilt dabei als zentrales psychotherapeutisches Behandlungsinstrument. Sprachliche Handlungen und ihre interaktionalen Funktionen sind aber auch der ureigene Gegenstand der Linguistik und insbesondere der linguistischen Gesprächsforschung.

Die ersten linguistisch motivierten technischen Aufzeichnungen von Gesprächen galten psychotherapeutischen bzw. psychiatrischen Interviews. 1961 publizierten die Psychiater Pittenger und Daheny zusammen mit dem Linguisten Hockett eine Untersuchung verbaler und paraverbaler Aspekte der ersten fünf Minuten einer psychotherapeutischen Sitzung anhand einer transkribierten Videoaufzeichnung. Zwölf Jahre später stellte Schefflen (1973) bereits multimo-

² Ausführlich dazu Peräkylä et al. (2008).

dale Analysen eines psychotherapeutischen Gesprächs vor, wobei er eine Typologie von neun Körperhaltungen entwickelte, die mit sprachlichen Handlungen wie Erklärung oder Verteidigung einhergehen. Ein gesprächslinguistischer Meilenstein war dann das Buch *Therapeutic Discourse: Psychotherapy as Conversation* von Labov und Fanshel (1977). Die Autoren untersuchten darin, bezogen auf therapeutische Interventionen, einen 15-minütigen Audioausschnitt eines Gesprächs mit einer Anorexie-Patientin. Mit der Identifikation rekurrenter diskursiver Praktiken oder der Analyse der spezifischen Rollenverteilung schufen sie dabei die Grundlage zur Erforschung psychotherapeutischer Gespräche, aber auch allgemein für Gespräche. Die Unterscheidung von gesprächsweise berichteten *events* nach epistemischer Autorität der Interaktanten in A- und B- resp. AB-*events*, mit der Wissensasymmetrien und Wissensabgleich rekonstruierbar werden, besitzt gegenwärtig hohe Relevanz bei der Erforschung von Kognitionen im Gespräch (Deppermann 2018) und hier insbesondere für Analysen zum psychotherapeutischen Gespräch (Weiste et al. 2016).

Seit den 1980er Jahren wurden auch im deutschsprachigen Raum psychotherapeutische Gespräche linguistisch-gesprächsanalytisch untersucht. Flader und andere machten dabei Asymmetrien in der Redebeteiligung oder Verstöße gegen Grice'sche Konversationsmaximen in einer von ihnen als »desozialisiert« charakterisierten Kommunikationssituation dingfest (Flader 1978, 1982; Koerfer und Neumann 1982). Diskutiert wurde die Frage, ob Psychotherapiegespräche mit alltagsweltlichen Methoden oder mit systematischen Abweichungen davon geführt werden. Scarvaglieri (2013) geht von Letzterem aus, wenn er faktische Weigerungen, konditionelle Relevanzen wie Antwort-Geben zu erfüllen, Modifikationen des Sprecherwechselmechanismus oder des Agenda-Setting durch den Therapeuten feststellt. Er analysiert anhand von Kurzzeittherapien Handlungen wie das »Verbalisieren des emotionalen Erlebnisgehalts« und das tiefenpsychologische »Deuten«, die der sprachlich vermittelten Wissensumstrukturierung dienen und damit zugleich die Handlungsfähigkeit der Patienten erweitern. Konerding (2015) kritisiert die auf Wissen und sprachliches Handeln beschränkte linguistische Forschung und fordert, auch die emotional-affektive Komponente einzubeziehen.

In der *Conversation Analysis* begann eine systematische Forschung zu psychotherapeutischen Gesprächen mit der Publikation von *Conversation Analysis and Psychotherapy* von Peräkylä et al. (2008). Darin werden von verschiedenen AutorInnen kommunikative Praktiken der therapeutischen Intervention, die dazu komplementären affirmativen oder widersetzlichen Reaktionen von Patienten oder die Herstellung von Handlungsfähigkeit und Veränderungsbereitschaft untersucht. Bezugspunkt aller Untersuchungen ist dabei eine zentrale Struktureigenschaft von Kommunikation: die grundsätzliche Sequenzialität

verbaler Interaktion (Deppermann 2008), also die aufeinander bezogene Abfolge von Äußerungen mindestens zweier Sprecher. Sie leistet und garantiert beispielsweise qua konditioneller Relevanz oder wechselseitiger Verständendokumentation die Herstellung von Intersubjektivität und bildet auf diese Weise die Grundlage therapeutischer Wirksamkeit (Peräkylä et al. 2008). So zeigen Voutilainen et al. (2018) in einer aktuellen Longitudinalstudie, wie sich Patientenantworten bezüglich einer bestimmten Therapeutenintervention im Muster von *adjacency pairs* fortlaufend verändern. Dem anfänglichen Widerstand gegen die therapeutische Agenda folgt eine Phase der Ambivalenz, die schließlich zu Zustimmung und Einlassung führt. Veränderung wird demnach erst durch die sequenzielle Organisation im und durch das therapeutische/n Gespräch erzeugt: Sprachhandlungen setzen verbale Reaktionen des Gesprächspartners konditionell relevant, die dann zustimmend oder ablehnend, präferiert oder dispräferiert sein können.³

Weiste und Peräkylä (2015) diskutieren, die konversationsanalytische Forschung zusammenfassend, veränderungsbegünstigende Sprachhandlungen im therapeutischen Diskurs. Veränderungen werden dabei durch den *moment-by-moment*-Nachvollzug der sprachlichen Interaktion adäquat beschreibbar (siehe auch Voutilainen et al. 2011; Voutilainen et al. 2018; Mack et al. 2016; Kabatnik et al. 2019). Als veränderungsbegünstigende Sprachhandlungen werden vor allem vier grundlegende therapeutische Interventionen unterschieden:

- *Extensionen*, also verstehende und weiterdenkende Fortführungen vollständiger Äußerungen,
- *Interpretationen* als verbalisierte Herstellungen eines umfassenderen Zusammenhangs mit grundlegenden psychischen Mustern und Dispositionen,
- *formulations* i. S. von Reformulierungen von Patientenäußerungen,
- und schließlich auch noch *Fragen*

Gemeinsam mit der – zustimmenden oder ablehnenden – Reaktion des Patienten erzeugen diese Sprachhandlungen eine sequenziell konstruierte Sinnbedeutung, die die Grundlage der nachfolgenden Interaktion bildet.

*Formulations*⁴ sind nach den Beobachtungen von Peräkylä (2013) die meist genutzte Sprachhandlung von Therapeuten in Psychotherapiegesprächen. Es

3 Zum konversationsanalytischen Konzept der Präferenz siehe Pomerantz und Heritage (2013).

4 Die Bezeichnung *formulation* ist m. E. unglücklich, da es sich nicht um isolierte, unabhängige Sprachhandlungen handelt, sondern vielmehr um Reformulierungen einer bereits verbalisierten Äußerung eines Gesprächspartners. Die begriffliche Problematik wird in der konversationsanalytischen Literatur vielfach und kontrovers diskutiert; vgl. Bilmes (2015: 8); Mack et al. (2016: 38); Scarvaglieri (2013: 36). Hier und bei den nachfolgend dargestellten Typen von *formulations* werden die englischsprachigen Bezeichnungen belassen, da Übersetzungen nur mit sehr komplexen Ausdrucksbildungen angemessen möglich sind.

handelt sich um Äußerungen im Deklarativsatzmodus, in denen Therapeuten anzeigen, wie sie die Darstellungen des Patienten verstehen. Die konversationsanalytische Forschung unterscheidet dabei vier Typen von *formulations* mit jeweils spezifischer psychotherapeutischer Funktion:⁵

- *Highlighting formulations* fokussieren emotional bzw. subjektiv erlebensbezogen konnotierte deskriptive Elemente in den Patientenäußerungen.
- In *rephrasing formulations* ersetzt der Therapeut deskriptive Elemente der Patientendarstellung durch Beschreibungen damit verbundenen subjektiven Erlebens und suggeriert dadurch, dass dies der »eigentliche« Gehalt der Patientenäußerung sei.
- *Relocating formulations* bringen verschiedene Darstellungen des Patienten zu verschiedenen Zeiten in einen gemeinsamen, psychologisch bedeutsamen wechselseitigen Erklärungszusammenhang. (Der Unterschied zur therapeutischen Interpretation besteht in der Differenz der Perspektive: Während *relocating formulations* Äußerungen des Patienten verknüpfen i. S. »Sie haben gesagt, dass ...« werden Interpretation aus der Perspektive des Therapeuten formuliert i. S. »Ich denke, dass ...«.)
- *Exaggerating formulations* schließlich übersteigern Darstellungen des Patienten, um deren Absurdität und Negativität zu verdeutlichen. Der Patient soll damit gezwungen werden, seiner eigenen Darstellung – und ggf. auch Weltwahrnehmung – zu widersprechen; tut er dies nicht, ist auch das ein guter Ausgangspunkt weiterer therapeutischer Diskussion.

Zu erkennen ist, in dieser Reihenfolge, an diesen vier Typen von *formulations* eine ansteigende Beteiligung des Therapeuten, der auswählt, einen nicht genannten Aspekt in den Vordergrund holt, verschiedene Darstellungen verknüpft oder sie gar überspitzt oder, wie es Weiste und Peräkylä formulieren: »In such formulations, the therapist transforms the client's account and adds some elements that were not originally in the client's turn« (2013: 306). Und auch die Elizitierungsstrategie der vier Typen von *formulations* bildet einen Zusammenhang, wobei dieser beim *exaggerating* durch die präferenzorganisatorische Richtung des Folgebeitrags – nämlich Widerspruch – vorgegeben ist, während *highlighting* wesentlich offener angelegt ist. Die Vorgabe durch *highlighting formulations* besteht zunächst nur darin, »mehr« zu dem fokussierten Gegenstand zu äußern, beziehungsweise auf irgendeine noch offene Weise näher auf diesen einzugehen. *Rephrasing formulations* verändern den Fokus von der sachlichen auf die psychologische Dimension und *relocating formulations* behaupten einen möglichen musterhaften Zusammenhang, zu dem der Patient im Folgenden Stellung beziehen soll.

5 Siehe dazu Weiste und Peräkylä (2015), Mack et al. (2016).

Der ausgeprägte Elizitierungscharakter von *formulations* macht aber auch deutlich, dass die konversationsanalytische Forschung zu Psychotherapiegesprächen deren Fragepotenzial unterschätzt bzw. nicht berücksichtigt. Als Äußerungen im Deklarativsatzmodus werden vergleichbare Sprachhandlungen in anderen Forschungsfeldern als Deklarativsatz-Fragen betrachtet, wie beispielsweise in vielen Untersuchungen zur Arzt-Patient-Kommunikation (Heritage 2010; Spranz-Fogasy 2010). Einen engen Zusammenhang von Fragen und *formulations* legt auch unsere Studie (Mack et al. 2016) zu therapeutisch funktionalen Typen von semantisch und syntaktisch definierten Fragen nahe, also von W-Fragen und Verb-Erststellungs-Fragen. Es zeigt sich, dass solche Fragen von Therapeuten in ähnlicher Weise wie *formulations* verwendet werden. Bevor ich im Folgenden die verschiedenen Fragetypen vorstelle und später in ihrem funktionalen Zusammenhang für psychotherapeutische Gespräche diskutiere, sollen aber jetzt erst noch die den Untersuchungen zugrundeliegenden Daten und Methoden vorgestellt werden.

3 Daten und Methode

Das Korpus der Untersuchung enthält 15 audio- und videoteknisch aufgezeichnete psychotherapeutische Diagnosegespräche aus einer Forschungsoperation zwischen dem Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim und der Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik in Heidelberg. TeilnehmerInnen sind fünf TherapeutInnen (1w/4m) und 15 PatientInnen (8w/7m). Die Gesamtdauer der Gespräche beträgt 18 Stunden und 43 Minuten (= 75 Minuten). Bei den Gesprächen handelt es sich um Erstinterviews, die mit dem Konzept und Manual der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD; siehe dazu Arbeitskreis OPD 2014) durchgeführt wurden. Die Gespräche wurden zu Forschungszwecken des OPD-Therapiekonzepts aufgezeichnet, eine weitere Behandlung des Patienten durch den jeweiligen Therapeuten ist nicht vorgesehen.⁶

Die OPD ist ein vom gleichnamigen Arbeitskreis entwickeltes Diagnostikverfahren, welches dazu dient, die Psychodynamik des Patienten einzuschätzen. Dabei zielt sie auf die Identifikation eines therapeutischen Fokus auf der Grundlage der im Gespräch ermittelten Biografie des Patienten. Die Fokusdefinition bezieht sich auf die hervorstechenden maladaptiven Beziehungsmuster, auf konflikthafte Lebensthemen und persönlichkeitsbezogene Einschränkun-

6 Die Gespräche wurden also nicht zu Zwecken der linguistisch-gesprächsanalytischen Forschung geführt. Die Ergebnisse der Gespräche wurden den behandelnden Therapeuten für die weitere Behandlung mitgeteilt.

gen, woraus dann die zentralen therapeutischen Ziele abgeleitet werden. Die therapeutischen Prozesse der nachfolgenden Psychotherapie können dann stets mit den ermittelten Therapiezielen abgeglichen werden, wodurch Veränderungen erkennbar werden. Dabei bezieht sich die OPD auf vier psychodynamische und eine deskriptive Achse (vgl. Arbeitskreis OPD 2014: 35–36):

1. Krankheitserleben und Behandlungsvoraussetzungen (psychischer, physischer oder sozialer Leidensdruck, Krankheitsverständnis, Behandlungsvoraussetzungen mit Betonung von Erlebensmomenten, Motivationen und vorhandenen Ressourcen, weniger das Krankheitsverhalten)
2. Beziehung (z. B. dysfunktionale Beziehungsmuster, Gegenübertragung)
3. Konflikt (intrapsychische, spannungsreiche Konfliktkonstellationen, lebensbestimmende, verinnerlichte Konflikte, welche interpersonellen Konflikten etc. gegenübergestellt werden können)
4. Struktur (Qualitäten oder Insuffizienzen psychischer Strukturen, strukturelle Bedingungen beim Patienten)
5. Psychische und psychosomatische Störungen nach Kapitel V (F) der ICD-10.

Auf den ersten vier Achsen der OPD werden spezifische Charakteristika und die Ausprägung der psychischen Störung, von der der erkrankte Patient betroffen ist, differenziert erfasst und schließlich auf der fünften Achse klassifiziert.⁷

Das oben dargestellte Korpus wurde hinsichtlich ganz verschiedener linguistisch-interaktionaler Phänomene analysiert. Dazu gehörten beispielsweise vages Sprechen von Patienten (Schedl et al. 2018), Relevanzmarkierungen (Münster 2015) und – in Anlehnung an das Konzept der ›doctorability‹ (Heritage und Robinson 2006; Halkowski 2006) – ›psychotherability‹ in Beschwerdendarstellungen (Fofana 2016), die Verwendung von Modalpartikeln (Fischer 2017) oder kommunikative Praktiken des Widerstands wie ›ich weiß nicht‹-Konstruktionen (Stremlau 2017). Alle Untersuchungen wurden mit den Methoden der linguistisch-gesprächsanalytischen Sequenzanalyse (Deppermann 2008) durchgeführt, die Phänomene also als auf der sprachlich-interaktiven Oberfläche sichtbare Untersuchungsgegenstände in ihrem nahen und weiteren Kontext analysiert.

Bei diesen Untersuchungen spielten neben *formulations* immer auch die Fragen des Therapeuten eine besondere Rolle und wurden daher selbst zum Untersuchungsgegenstand. Da *formulations* einen Fragen vergleichbaren starken elizitierenden Gehalt haben, lag es nahe, zu prüfen, ob die funktionale Typologie, die für *formulations* entwickelt wurde, auch auf Fragen übertragbar war. Dies wurde durch unsere Studie (Mack et al. 2016) bestätigt, jedoch fanden sich weitere funktionale Fragetypen, die nicht in die Typologie integrierbar waren.

⁷ Ausführlich dazu siehe auch Mack et al. (2016: 18–25).

Im Folgenden möchte ich die verschiedenen Fragetypen vorstellen und sie dann in ihrer Funktionalität für psychotherapeutische/psychodiagnostische Gespräche diskutieren.

4 Fragen im psychotherapeutischen Gespräch

Fragen in der Form von W-Fragen und Verb-Erststellungs-Fragen (V1-Fragen) sollen im psychotherapeutischen Gespräch die Selbstexploration von Patienten anregen. Im Unterschied zu *formulations*, *Extensionen* oder *Interpretationen*, die als *responsive actions* bezeichnet werden, werden sie als *initiator actions* betrachtet (Vehviläinen et al. 2008). Wie schon der initiatorische Aspekt von *formulations* (und dito von Extensionen und Interpretationen) in der konversationsanalytischen Forschungsliteratur unterschätzt wird (s.o.), wird damit nun der responsive Charakter von Fragen weitgehend ausgeblendet. Dagegen zeigen Boyd und Heritage (2006) oder Spranz-Fogasy (2010), dass Fragen Präsuppositionen enthalten, die dem bisherigen Gespräch entnommen sind bzw. Verstehen dokumentieren, das in vorangegangenen Äußerungen verhandelt wurde. Beide Arbeiten zeigen auch, dass V1-Fragen einen höheren epistemischen Status anzeigen als W-Fragen (und Deklarativsatz-Fragen fast schon Gewissheit des Sprechers dokumentieren).

Der Funktionsfokus von Fragen liegt aber natürlich in der Projektionskraft für nachfolgende Reaktionen. In den Reaktionen zeigt sich, wie Fragen verstanden wurden, ob sie typ-gemäß als offene Fragen (i.e. W-Fragen) oder Entscheidungsfragen (i.e. V1-Fragen) bearbeitet werden oder ob sie präferiert oder dispräferiert behandelt werden. Die Reaktionen zeigen also auf, ob der Patient den Agenda-Vorgaben des Therapeuten nachkommt oder ob er sich auf die eine oder andere Weise widersetzt. Solcher Widerstand wird in der psychotherapeutischen Praxis jedoch als produktiver Bestandteil verstanden, eben nicht als zu beseitigendes Hindernis, sondern vielmehr als »part and parcel of the very activity of doing therapy« (Voutilainen und Peräkylä 2016: 549). Jegliches Verhalten, das in Verbindung mit Ablehnung oder Gegenwehr steht, deutet danach auf eine schmerzhaft, aber essenzielle Erfahrung des Patienten und sollte daher zum Ausgangspunkt ausführlicherer Betrachtung gemacht werden. Die Herausforderung des Therapeuten besteht vor diesem Hintergrund nicht zwangsläufig darin, den Widerstand zu überwinden, sondern dessen nutzbringende Funktionen anzuerkennen und den Patienten in der Wahrnehmung seines widerständigen Verhaltens zu unterstützen, es gemeinsam im Gespräch aufzuarbeiten und damit ein beidseitiges Verständnis der ursächlichen Leiden des Patienten zu generieren.

Gesprächsanalytisch werden hinsichtlich therapeutischer Fragen Antwort- von Nicht-Antwort-Reaktionen unterschieden (*answer* vs. *non-answer responses*; siehe MacMartin 2008). MacMartin, die Reaktionen auf optimistische Fragen (*optimistic questions*) untersucht hat, identifiziert dabei als dritte Gruppe von Antwortreaktionen noch *answer-like responses*, die Fragen in ihrem Gehalt oder ihrer Agenda retrospektiv modifizieren (*refocusing*) und damit ihre ursprüngliche Intention verändern.⁸ Ergänzend zu dieser Einteilung haben wir einen weiteren Typ dispräferierter Patientenreaktionen nachgewiesen (Kabatnik et al. 2019), den wir *partiell konforme Antworten* nennen. Dabei handelt es sich um einen Mischtyp zwischen dispräferierten und präferierten Reaktionen, der die formalen und inhaltlichen Anforderungen der Frage zwar erfüllt, aber gleichzeitig strukturelle oder formulierungsdynamische Merkmale von Dispräferiertheit aufweist, wie Verzögerungen, Abschwächungen oder Erklärungen.

5 Funktionstypen von Fragen in Therapiegesprächen

Aus sprachhandlungsfunktionaler Perspektive können, wie oben dargestellt, auch *Formulations* als Deklarativsatz-Fragen betrachtet werden. Für die Entwicklung einer Funktionstypologie von Fragen in Psychotherapiegesprächen lag es daher nahe zu überprüfen, ob sich die funktionale Typologie, die in der konversationsanalytischen Psychotherapieforschung zu *formulations* entwickelt wurde, auf eigentliche Fragen i. S. von W- und V1-Fragen übertragen lassen. Bei dieser Überprüfung konnten alle vier Typen nachgewiesen werden, die hier in gebotener Kürze zunächst vorgestellt werden sollen (ausführlich siehe dazu Mack et al. 2016).

5.1 Fragen mit *Highlighting*-Funktion

Fragen werden in Gesprächen im Sinne des Verstehensmanagements vielfach zum Zweck der Klärung einer vorangegangenen Äußerung eingesetzt. In psychotherapeutischen Gesprächen ist es wichtig, bestimmte Themenaspekte eingehender zu beleuchten. Im folgenden Ausschnitt hebt der Therapeut (T) aus den Darstellungen des Patienten (P) einen einzelnen psychologisch relevanten Aspekt hervor:

⁸ Siehe auch Stivers und Hayashi (2010: 2), die solche Antworten als *transformative responses* bezeichnen.

T3_1 (00:39:55)⁹

- 415 **T3** was machen sie dann?
 416 (0.33)
 417 **T3** an solchen tagen?
 418 (2.13)
 419 **P** ja versuch ich solchen themen eigentlich
 aus_m weg zu gehn:
 420 **T3** hmhm
 421 **P** ((Einatmen, ca. 1.5 Sek.)) mich
 abzulenken h° also gestern abend war_s
 ganz schlimm hh° da war ich wieder in
 so_n gedankenkarussell
 422 (0.22)
 423 **P** und
 424 (0.72)
 425 **T3** hm.
 426 **P** ((schmatzt)) sorgen beruf un:d [°hh]
 427 **T3** [hm]
 428 (0.66)
 429 **P** schuldgefühle irgendwo auch
 430 (0.86)
 431 **P** was ich (.) ja (.) und dann
 432 **T3** was für schuld[gefühle?]

Der Therapeut übernimmt hier zur Identifikation des Fragefokus die Wortwahl des Patienten, gleichzeitig blendet er andere Aspekte in der Darstellung des Patienten aus, die auch von psychotherapeutischem bzw. -diagnostischem Interesse sein könnten wie z. B. hier den Ausdruck *gedankenkarussell*.

Highlighting-Fragen erfolgen in den mir vorliegenden Daten meist in Form einer W-Frage, was anzeigt, dass es um kategoriale Wissens Elemente gehen soll. W-Fragen erlauben dabei einen einfachen Zugriff auf das interessierende Element aus der Vorgängeräußerung und machen es so zum Gegenstand einer vertiefenden therapeutischen Exploration.

5.2 Fragen mit *Rephrasing*-Funktion

Neben der Hervorhebung einzelner Elemente können Fragen in Psychotherapiegesprächen auch dazu dienen, einen Wechsel auf die emotionale Ebene vorzunehmen. Auf diese Weise werden aus sachlichen Berichten mögliche, mit den berichteten Ereignissen verbundene Erlebensweisen erfragt und ggf. als im Bericht implizierter Gehalt suggeriert. Vor dem nachfolgenden Gesprächsaus-

⁹ Transkriptausschnitte werden gemäß GAT 2 als Minimaltranskript dargestellt (s. Selting et al. 2009). Die Gespräche werden den Therapeuten zugeordnet (hier T3) und dann den von ihnen aufgezeichneten Gesprächen in der Reihenfolge (hier Gespräch_1). Die Zeitangaben beziehen sich auf den Beginn des Ausschnitts.

schnitt hatte der Patient berichtet, dass er mit einem Freund Äpfel sehr vorzeitig vom Baum geholt (hier: *geruppt* für ›gerupft‹) habe, was ihm Ärger mit seinem Vater eingebracht hatte:

T3_1 (00:22:36)

395 P von meinem vater
 396 T3 (.) (hm)
 397 (0.41)
 398 T3 wissen sie noch was e:r gesagt oder was sie so
 399 (1.24)
 400 P hm ja:: (.) (uns halt) hh° äh
 401 (0.59)
 402 P angemotzt dass die f:: [dass |wir die
 viel zu früh geruppt haben dass dass
 dass man damit nix mehr anfangen kann
 403 T3 [hm]
 404 T3 hmhm
 405 (1.14)
 406 T3 und was hat das bei ihnen für_n gefühl
 407 (0.79)
 408 T3 hervorgerufen in der situation?

Der Therapeut greift hier nicht, wie bei *Highlighting*-Fragen, auf das Ausdrucksmaterial des Patienten zurück, sondern bringt initiativ den Aspekt des ›Gefühls‹ ein. Präsupponiert ist dabei, dass eine solche Situation, in der der Patient und sein Freund *angemotzt* wurden, mit einer erinnerbaren inneren Wahrnehmung von Emotionen einhergeht. Der Patient gibt daraufhin an, ein *schlechtes gefühl* gehabt zu haben und präzisiert später auf insistierende Nachfrage des Therapeuten, das Gefühl zu benennen, dass er *n gefühl von wut* – gegen sich selbst und gegen seinen Vater – erlebt habe. Die *Rephrasing*-Frage erreicht also das Ziel, die subjektive Erlebensebene des Patienten zu fokussieren und ein psychologisch bedeutsames starkes Gefühl auf die interaktionale Oberfläche zu bringen.

Bei *Rephrasing*-Fragen werden W- und V1-Fragen gleichermaßen eingesetzt, neben kategorialen Eigenschaften werden auch attributive Zuschreibungen zu elizitieren gesucht.

5.3 Fragen mit *Relocating*-Funktion

Therapeutenhandlungen mit *Relocating*-Funktion zeigen eine strukturelle Ähnlichkeit zwischen dem vom Patienten aktuell berichteten Ereignis und einem anderen, zuvor berichteten Erlebnis auf, indem sie beide Patientenerfahrungen verbal miteinander verknüpfen. Das setzt auf der Seite des Therapeuten voraus,

dass er die verschiedenen Sachverhalte kennt und sie in einen gemeinsamen Zusammenhang stellen kann.

Im folgenden Ausschnitt überträgt der Therapeut probatorisch eine Bezeichnung, mit der die Patientin zuvor sich selbst charakterisiert hatte, auf den Lebenspartner der Patientin:

T2_4 (00:17:29)

11 P °hh ((schnalzt)) (.)
 12 da versuch ich mich natürlich
 abzuGRE:Nzen
 13 (0.57)
 14 °hh bei_m FREUND versuch ich_s !AUCH!
 15 es is beides en: (.) kraftAKT [heh]
 16 T [hm:hm]
 17 P s_is schwierig (.)
 18 T Hm
 19 P und dann kommt natürlich jetzt dazu
 dass ich mir natürlich au=ä:h
 20 (0.93)
 21 en neuen job wieder such[en muss]
 22 T [hmmh] (.) °hh (.)
 23 **ist der freund jetzt (0.68) ne (.) ne**
zecke (--) wo sie vorher eine waren in
beziehungen od (--)
 24 **also ist der SE:hr abhängig von ihnen**
ode:r
 25 P ((Einatmen, 1.07 sek.))
 26 T **kann man das so nich sagen=**
 27 P <<flüsternd> =ist der ABhängig>
 (1.66) °hh
 28 T [wenn er an ihnen] zieht
 29 P [pu::h]
 30 (1.35)
 31 ((Einatmen, 0.56 Sek.)) ABhängig is der
 net nee

Die Frage des Therapeuten bezieht sich dabei auf eine Passage ca. vier Minuten zuvor:

T2_4 (00:13:02)

1 P °hhh (.) ja un hab des dann halt e:ben
 wie gesagt hab halt versucht in MEInen
 bezie:hunGEN=
 2 T =hmmh
 3 P ((Sprechansatz, 0.82 Sek.)) mir dann so
 meine EIgene welt zu: (.) zimmern
 [im wahrsten] sinne des wortes
 4 T [hmmh]

- 5 **P** °hh aber die partner die ich angezogen
 hab die haben selbst BAUstellen gehabt
 OHne enDE
- 6 **T** <<leise> hmhm>
- 7 **P** °hhh (.) <<p> des war gar net
 mö:glich=und> ich hab die: ja auch so:=
 =hab mich da so <<cresc> dran::> (.)
- 8 **P** °h wie so ne zecke [im PE:LZ]=ne (.)
- 9 **T** [<<cresc> hm:>]
- 10 **P** °hhh also die waren da
 höchstwahrscheinlich auch völlig mit
 überFORDert (.)

Der metaphorisch gebrauchte Ausdruck *zecke* bzw. die Wendung *zecke im PE:LZ* kennzeichnet ein bestimmtes Beziehungsverhalten i.S. einer einseitig hergestellten, zwanghaft gesuchten Nähe. Das Beziehungsmuster wird in der *Relocating*-Frage der Patientin allerdings als passives unterstellt, was diese aber zurückweist. Dennoch hat der Therapeut mit seiner Frage ein potenzielles Muster identifiziert und der Patientin zur Reflexion vorgelegt.

Noch einmal fast 40 Minuten später im Gespräch nutzt der Therapeut die Metapher erneut in einer *relocating formulation*, als die Patientin hypothetisch eine Mutterschaft anspricht:

T2_4 (00:56:23)

- 57 **P** also wenn ich n_KIND hätte=ich würde
 wahrscheinlich KEINE nacht schlafen (.)
- 58 **T** hmhm
- 59 (0.89)
- 60 **P** a=esch ded verrickt werra glaub ich (.)
 also (des_s:) <<dim> s s s>
- 61 (0.49)
- 62 unvorstellBA:R ((Lachen, 1.16 Sek.))
- 63 unvorstellbar [((Lachansatz))]
- 64 **T** [hmhm]
- 65 **P** °hhh (.)
- 66 <<f> ÄHM:> (.) <<acc> ja ne: geht gar
 net>
- 67 (0.81)
- 68 **T** °h so_n kind is ja auch ne zecke gell
- 69 (1.07)
- 70 **P** klar
- 71 (0.91)
- 72 **T** (also) es saugt sich fest und hh°
- 73 (0.76)
- 74 dann (.) is man DRAN

Der Therapeut kann sich hier auf eine Ausdrucksreferenz beschränken, da der Ausdruck *zecke* offensichtlich ausreichend klar Musterhaftigkeit indiziert. *Relocating*-Fragen müssen sich aber nicht auf Ausdrucksredundanzen beschrän-

ken, es können auch weit komplexere Sachverhaltsdarstellungen in Beziehung gesetzt werden. *Relocating*-Fragen zielen jedenfalls stets auf Musterhaftigkeit, indem verschiedene Verhaltensweisen oder Situationen miteinander in Verbindung gebracht werden.

5.4 Fragen mit *Exaggerating*-Funktion

Die übertreibende Funktion des *exaggerating* lässt sich in Fragen schlecht realisieren, da sie ja mit einer unumstößlichen Behauptung operiert, wodurch der Widerstand des Patienten elizitiert werden soll.¹⁰ Dennoch konnte auch eine Frage mit *Exaggerating*-Funktion im hier zugrundeliegenden Korpus identifiziert werden. Der Patient hatte von seiner Eifersucht im Umgang mit ihm nahen Personen gesprochen und davon, wie schwer es ihm falle, anderen zu vertrauen. Schließlich stellt er als ein persönliches Manko fest, anderen keinen *freiraum* lassen zu können, womit folgende Aushandlung eröffnet wird:

T3_1 (00:48:14)

- 1 P ähm h° h° (3.0) ja (0.69) vielleicht
 dem anderen mehr freiraum (0.25) zu
 lassen (.) das kann ich nich so gut
 (0.54)
- 2
- 3 T ((schmatzt)) **wollen sie jemanden ganz**
 für sich alleIne haben wenn sie mit
 jemandem (0.57) sammen sind
 (0.56)
- 4
- 5 P n nee nich ganz für mich allein aber
 (.) ähm (0.97) ja irgendwo vielleicht
 (0.21) schon dass ich (ähm/ihn) (0.8)
 gern die meiste zeit bei mir hab (1.83)
 äh (2.02) un auch so (.) den (0.18)
 freiraum (.) dass ich jemanden (.) gut
 vertrauen kann::: °hh in der hinsicht
 dann einfach äh (0.26) auch ohne ängste
 (ihm/eben) zu verlieren oder so des:: is
 dann auch dann wieder is ja auch [(son)
 wieder] so des thema angst

Der Therapeut kehrt in seiner Frage die Wendung *anderen mehr freiraum (0.25) zu lassen* um zu *jemanden ganz für sich alleIne haben* wollen und bezieht das noch direkt und einschränkend auf eine Partnerbeziehung (*wenn sie mit jemandem (0.57) sammen sind*). Das Beziehungsmuster wird damit überspitzt und

¹⁰ Zu anderen einschränkenden Bedingungen des Datenkorpus wie die Einmaligkeit der hier untersuchten Interviews oder das Konzept der OPD gegenüber anderen Therapiekonzepten vergleiche Mack et al. (2016: 72).

verabsolutiert. Der Patient weist dies zwar zunächst – gewissermaßen »wunschgemäß« – zurück, relativiert aber in seinen folgenden Ausführungen diese präferierte Reaktion, beginnend schon mit der Einschränkung bzw. eigentlich einem teilweisen Zugeständnis *nich ganz*. Das *exaggerating* zeitigt hier dennoch das erwünschte Ergebnis, eine kritisch-selbstreflexive Exploration beim Patienten zu initiieren.

Beim Versuch der Übertragung der Funktionsdifferenzierung von *formulations* auf Fragen zeigt sich also, dass alle Funktionen auch mithilfe von Fragen realisiert werden können. Es zeigen sich jedoch auch viele Mischformen dieser Funktionen in Fragen (siehe Mack et al. 2016: 75), wobei die Durchsicht von *formulations* ebenfalls viele Mischformen ergab.¹¹ Darüber hinaus fanden sich aber auch Fragen, die nicht in die hier vorgestellten vier Funktionsmuster eingeordnet werden konnten, und die im Folgenden näher betrachtet werden sollen.

5.5 Weitere Fragetypen

Bei der exhaustiven Durchsuchung des Korpus auf Fragen hin konnten drei weitere Fragetypen ermittelt werden: *Kollaborative Erklärungsfindungsfragen*, *Lösungsorientierte Fragen* und *Beispiel-Nachfragen*. Diese Fragetypen wurden in verschiedenen Arbeiten eingehender analysiert (Mack et al. 2016; Spranz-Fogasy et al. 2019, im Druck; Blöcher 2017; Siebeking-Thompson 2017; Bröcher 2017; Oelschläger 2017; Marciniak 2017; Läßle et al. i. V.), die Ergebnisse sollen hier ebenfalls, jedoch etwas ausführlicher, vorgestellt werden. Dabei wird im Folgenden nicht nur die einzelne Fragehandlung betrachtet, sondern es werden auch der Kontext bzw. sequenzielle Vorlauf und besonders auch die nachfolgenden Äußerungen in die Analysen einbezogen.

5.5.1 Beispiel-Nachfragen¹²

Beispiel-Nachfragen folgen in psychotherapeutischen Diagnosegesprächen stets auf unklare, vage oder zu allgemeine Darstellungen von Patienten. Es lässt sich zeigen, dass insbesondere das Fehlen einzelner oder mehrerer inhaltlicher Strukturelemente komplexer Sachverhaltsdarstellungen wie Situationsbe-

11 Mischformen machen bei beiden Sprachhandlungstypen, also *Fragen* und *formulations* Sinn, weil sie psychotherapeutisch/-diagnostisch produktiv sind dahingehend, dass Patienten in ihren Reaktionen ihren eigenen Schwerpunkt setzen können und auch dies für den Therapeuten eine wichtige Information sein kann.

12 Ausführlichere Darstellungen zu Beispiel-Nachfragen finden sich in Spranz-Fogasy et al. (2019, im Druck).

schreibung, Ereignisketten oder Ereignisträger Beispiel-Nachfragen auslösen.¹³ Beispiel-Nachfragen dienen also zunächst der Referenzklärung, sind aber auch psychodiagnostisch implikativ, da sie über den exemplarischen Charakter einer geforderten Sachverhaltsdarstellung immer auch auf Musterhaftigkeit zielen. Im zugrundeliegenden Korpus konnten 33 explizite Beispiel-Nachfragen, die den Ausdruck *Beispiel* enthalten, in zwölf Gesprächen identifiziert werden.¹⁴

Beispiel-Nachfragen entstehen im Rahmen von Aushandlungsprozessen. Sie setzen eine bestimmte Reaktion konditionell relevant, nämlich ein Beispiel darzustellen¹⁵ und fordern damit immer mehr als eine Ja/nein-Antwort. Beispiel-Nachfragen projizieren also eine Antwort seitens des Patienten sowie daran in der dritten Position anschließend eine darauf bezogene explizite oder implizite Beurteilung durch den Therapeuten.¹⁶

Bei *Beispiel-Nachfragen* handelt es sich zumeist um kurze Äußerungen, die deiktisch auf ihre meist unmittelbar vorangehende Bezugsäußerung referieren. Eine prototypische Formulierung ist *Haben Sie vielleicht ein Beispiel dafür?*; sie enthält alle relevanten Elemente einer Beispiel-Nachfrage: V1-Stellung (*haben*), direkte Adressierung (*Sie*), Modalisierung (*vielleicht*), Angabe der gewünschten Handlung (*Beispiel*) und der Referenz (*dafür*).

Im Folgenden soll eine Fallanalyse etwas ausführlicher die sequenzielle Organisation von Beispiel-Nachfragen aufzeigen und ihre psychotherapie- resp. psychodiagnose-spezifischen Leistungen verdeutlichen. Aus Platzgründen und zum leichteren Nachvollzug ist der Gesprächsausschnitt gekürzt:

T5_2 (00:09:00)

- 023 **T5** °h ham sie diese anspannung eigentlich
 schon mal bemerkt wenn sie sich
 irgendwie geärgert ham oder wenn sie
 sich sorgen gemacht haben um ne
 beziehung oder um einen menschen
 024 (14.82)
 025 **P** °hh h° also ich merk eigentlich dann
 wenn ich äh (.) streite

13 Zu Strukturelementen von Erzählungen und Beschreibungen vgl. Kallmeyer und Schütze (1977).

14 Es fanden sich in fast allen Gesprächen auch implizite Beispiel-Nachfragen etwa nach einer »typischen Situation«. Implizite Formen werden in Blöcher (2017) untersucht, die zeigt, dass die Ausdruckswahl präzise auf den lokalen Kontext zugeschnitten ist.

15 Zu den vielfältigen Formen und Funktionen von Beispieldarstellungen im Deutschen siehe Rettig (2014).

16 Implizite Bewertungen erfolgen vielfach durch den Vollzug weiterführender Handlungen, mit denen signalisiert wird, dass die Reaktion zufriedenstellend war. Zu solcher »Ratifikation qua Vollzug« siehe Spranz-Fogasy (1986: 96).

- 026 (0.5)
 027 **P** ((schmatzt)) dass dann die körperlichen
 symptom(.)me schwerer werden
 028 (0.26)
 029 **P** ((schmatzt)) oder (.) beziehungsweise
 stärker werden
- [Auslassung]**
- 058 **P** vor allem bei (.) wie gsagt personen
 die mir (.) nah stehn eltern freundin
 ((schnalzt))
 059 (1.33)
 060 **P** ähm da föhl ich mich dann schon (.)
 sehr angespannt un_möchte das ganze
 eigentlich gern abbrechen un_dann fi
 kann i nich weider (.) diskutieren (.)
 weil ich des geföhl habe es schadet mir
 061 (0.91)
 062 **T5** **ham sie da ein beispiel für**
 063 (1.05)
 064 **P** pf es gibt so viel dispute
 065 (0.32)
 066 **P** ((brummt))
 067 (0.43)
 068 **P** wenn einfach ähm der partner die eltern
 mit ner gewissen situation net
 zufrieden sind
 069 (1.4)
 070 **P** ich hätte das tun sollen habe es nich gemacht
 071 (0.67)
 072 **P** oder ähm was auch immer es es jetzt ganz
 (.) ganz zu konkretisieren fällt mir
 einfach schwer des sin_alltags (.)
 sachen kleine streitereien sag ich mal
 aufgrund von (.) °h kleinen
 gegebenheiten
 073 (1.21)
 074 **P** ähm m m warum hast du heut nich
 eingekauft ich war den ganzen tag
 arbeiten jetzt muss ich wieder mit ich
 würd gern heim lieber jetzt was essen
 jetzt muss ich noch einkaufen gehen hab
 ich kein bock drauf °hhh und so sachen
 (.) ähm wo man da einfach kleinichkeit
 streitet
- [Auslassung]**
- 092 **T5** wie geht_s ihnen dabei wenn sie das so zu ihnen sagt

Vor diesem Gesprächsausschnitt hatte der Patient berichtet, dass er aktuell dasselbe Hemd anhabe, das er bei seinem ersten Panikanfall getragen hatte; er formuliert dies in der Weise eines sachbezogenen Berichts. Die Therapeutin schließt eine Frage an, die *Rephrasing*-Charakter besitzt und mit *geärgert* und

sich sorgen gemacht haben die Erlebensebene des Patienten fokussiert (Segment 23). Nach einer ungewöhnlich langen Pause von 14.82 Sekunden beginnt der Patient längere Ausführungen, in denen er eher allgemein und abstrakt Situationen schildert, die für ihn mit Anspannung verbunden sind (S 25–60). Hier schließt dann die Beispiel-Nachfrage der Therapeutin an: *ham sie da ein beispiel für* (S 62). Der Patient reagiert darauf zunächst in vielfältiger Weise ausweichend dispräferiert: mit dem abwehrenden Antwortmarker *pf*, der Überverallgemeinerung *es gibt so viele dispute*, mit mehreren Pausen oder einer erneuten allgemeinen und abstrakten Situationsschilderung *wenn einfach ähm der partner die eltern mit ner gewissen situation net zufrieden sind* (S 68) und schließlich einer expliziten Ablehnung *es jetzt ganz (.) ganz zu konkretisieren fällt mir einfach schwer* und einer erneuten allgemeinen Darstellung *des sin_alltags (.) sachen kleine streitereien sag ich mal aufgrund von (.) °h kleinen gegebenheiten* (S 72). Nach einer weiteren Pause beginnt er dann jedoch eine Beispieldarstellung, wobei er seine Lebenspartnerin wörtlich zitiert (S 74). Nach weiteren Ausführungen zu diesem Vorfall (hier ausgelassen) folgt eine erneute (*Rephrasing*-)Frage der Therapeutin, mit der sie den Patienten auf sein subjektives Erleben der geschilderten Situation lenkt: *wie gehts ihnen dabei wenn sie das so zu ihnen sagt* (S 92). Die vom Patienten geschilderte Szene wird auch im Folgenden noch Ausgangspunkt für eine ausführliche gemeinsame Diskussion über das Handeln und Beziehungsverhalten des Patienten sein.

Der hier vorgestellte und kurz analysierte Gesprächsausschnitt ist in unseren Daten prototypisch für die sequenzielle Organisation im Umfeld von Beispiel-Nachfragen. Beispiel-Nachfragen etablieren neben der sequenziellen Projektion auch eine *retro-sequence* i.S. Schegloffs (2007), indem sie die vorangehende Äußerung implizit als ungenügende Reaktion in Bezug auf eine vorausgehende Sprachhandlung des Therapeuten charakterisieren. Diese vorausgehende Sprachhandlung ist dabei in unseren Daten immer eine Darstellungsaufforderung mit *Rephrasing*-Charakter, zielt also auf die subjektive Erfahrungsebene, die in der Bezugsäußerung des Patienten nicht thematisiert worden war.

Die gesamte Sequenz, die durch eine Beispiel-Nachfrage organisiert wird, lautet also zusammengefasst so:

1. Therapeut: Reformulierung oder Frage (*rephrasierend*)
2. Patient: eigene (ungenügende) Darstellung
3. **Therapeut: Beispielnachfrage**
4. Patient: Beispieldarstellung, oft erst nach dispräferierter Reaktion und Insistenz des Therapeuten
5. Therapeut: Bewertung der Beispieldarstellung und weitere Bearbeitung

Der in 4. genannte Widerstand des Patienten als Folge der Beispiel-Nachfrage ist auffällig häufig in den Daten (in 21 von 33 Fällen), er belegt damit auch nachträglich die Reaktion des Patienten auf eine *Rephrasing*-Aktivität als ausweichend – der Therapeut trifft offensichtlich ein wichtiges und problembehaftetes Thema beim Patienten.¹⁷

Beispiel-Nachfragen elizitieren dabei markante Einzelfälle, an denen Wahrnehmungs- und Handlungsstrukturen deutlich hervortreten, auch, weil der Patient sie selbst als paradigmatisch auswählt. Beispieldarstellungen selbst sind dann stets Darstellungen von Einzelfällen eines globaleren Sachverhalts, den (notwendiger Weise) mehrere solcher Einzelfälle konstituieren. Die Erfahrung mehrerer Einzelfälle kann sich bei Patienten zu einem – oft destruktiven – Wahrnehmungs- und Handlungsmuster verselbständigen oder bereits verselbständigt haben und die Wahrnehmung aktueller und künftiger Erfahrungen oder des Handelns beeinträchtigen oder steuern.

Beispieldarstellungen decken Strukturelemente des vom Patienten nicht ausreichend dargestellten globaleren Sachverhalts und deren Bezüge zueinander auf. Beispieldarstellungen bedeuten damit ›Arbeit am Detail‹ (i. S. *pars pro toto*):

- Sie erlauben die Feststellung von Voraussetzungen und Gründen am Beispielfall;
- sie leisten die Aufdeckung der Beteiligung des Patienten am berichteten Geschehen (seine Wahrnehmung, sein Handeln);
- und sie ermöglichen die Durcharbeitung von Alternativen.

Die Auseinandersetzung mit Beispielen kann destruktive Wahrnehmungsmuster und darauf bezogenes destruktives Handeln (bzw. Handlungsmuster) am übersichtlicheren und oft auch klareren Einzelfall aufdecken und bearbeitbar machen (Reflexion) und günstigenfalls auch positiv beeinflussen (Veränderung). Für Reflexion bedeutsam ist die Möglichkeit, globalere und konkretere Beschreibungen wechselseitig und in mehreren Runden aufeinander beziehen und dabei alternative Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten entwickeln zu können.

Beispiel-Nachfragen zeigen damit paradigmatisch ein in höchstem Maße produktives psychotherapeutisch-diagnostisches Vorgehen durch:

- sequenziell direkten Anschluss an Patienten-Darstellungen
- spezifische Verarbeitung von – ausweichenden – Patienten-Darstellungen
- Turnübergabe mit einer spezifischen Aufgabenstellung

¹⁷ Die Ausführungen gelten nicht für die Verwendung von Beispiel-Nachfragen in anderen Interaktionssettings. Anders ist dies bspw. im Kontext von Führungskräfte-Coachings. Hier thematisiert der Klient initiativ die subjektive Erlebensebene und gibt auch bereitwillig Beispieldarstellungen. Vgl. hierzu Spranz-Fogasy et al. (2019). Zu Fragen im Coaching allgemein siehe Graf und Spranz-Fogasy (2018).

- Aufforderung zur Aufdeckung exemplarischer, tieferliegender Erlebens- und Handlungseigenschaften
- Reflexionsanregung und Erzeugung von Veränderungspotenzialen

Die in der Forschung propagierte therapeutische Wirksamkeit sequenzieller Strukturen findet also gerade in Beispiel-Nachfragen ihr Muster-Beispiel.

5.5.2 Fragen zur kollaborativen Erklärungsfindung

Ein zentrales Ziel von Psychotherapie ist die Entwicklung eines Verständnisses der Probleme des Patienten. Im Unterschied zum körpermedizinischen Arzt-Patient-Gespräch, in dem die Arbeit an der Erklärungsfindung überwiegend beim Arzt liegt, darf und soll der Patient sich im psychotherapeutischen Gespräch an der Verstehensarbeit beteiligen. Er soll selbst ein Verständnis seiner Probleme entwickeln, um sich für ihn bis dato undurchschaubare Prozesse, Strukturen und Muster bewusst machen zu können und sich durch einen bewussten, reflektierten Umgang damit neue Gestaltungsmöglichkeiten seines Denkens und Handelns zu erschließen.

Fragen zur kollaborativen Erklärungsfindung wie beispielsweise *ham sie selber ne hm theORIE warum das für SIE so schwER is* dienen der Initiierung gemeinsamer Ursachenklärung, wobei damit vom Therapeuten en passant auch Wahrnehmungs- und Erlebensmuster des Patienten ermittelt werden können. Bei der Untersuchung dieses Fragetyps stehen wir noch am Anfang, sicher ist nur, dass viele Patienten darauf erst einmal keine Antwort haben, also dispräferiert reagieren, und Therapeuten nur mit Insistieren relevante Informationen elizitieren.

Im Datenkorpus fanden sich insgesamt 57 Fragen zur kollaborativen Erklärungsfindung. Sie finden sich regelmäßig gegen Ende von Aushandlungen zu einzelnen Problemkomplexen, entweder, wenn ein Verhalten oder eine Denkweise des Patienten besonders prominent erscheint oder wenn für den Therapeuten ein Muster erkennbar geworden ist.

Mit kollaborativen Erklärungsfindungs-Fragen wird der Patient dann direkt angesprochen und die Aufgabe der Suche nach einer Erklärung wird mit einem Ausdruck aus dem Wortfeld ›Erklärung/›Theorie‹ auch sprachlich als solche gekennzeichnet.

Vor dem folgenden Ausschnitt dreht sich das Gespräch thematisch fast ausschließlich um die Themen ›Ausbildung‹ und ›Beruf‹, und der Patient berichtet, dass er seine Ausbildung als schwierig erlebt und häufig wiederkehrende Ängste erfahren hat, nicht mit den anderen mithalten zu können. Nach eigener Einschätzung würden in seiner Selbstwahrnehmung stets seine Schwächen zu stark

betont. Der Therapeut kommentiert dies mittels einer *rephrasing formulation* und fragt dann nach:

T3_1 (00:10:31)

1 **T** da sin sie ganz schön
 2 (1.04)
 3 **T** hart mit sich
 4 (0.46)
 5 **T** [(+++)]
 6 **P** [ja]
 7 (4.5)
 8 **T** **ham sie ne ahnung womit diese härte**
 9 (0.58)
 10 **T** **sich selbst gegenüber (.)**
 zusammenhängen mag
 11 (1.84)
 12 **T** **irgendne vermutunk**

In seiner *formulation* verallgemeinert und pointiert der Therapeut den in Rede stehenden Problemkomplex als *hart mit sich selbst*. Der Patient bestätigt dies zwar, nimmt aber den ihm damit eröffneten Slot zur Redeübernahme nicht wahr (erkennbar an der Pause von 4.5 Sekunden). Die anschließende (V1-)Frage des Therapeuten ist in mehreren Hinsichten durch eine zögerliche Formulierungsdynamik gekennzeichnet: Der Patient wird mit den Ausdrücken *ahnung* und *vermutunk* nach seinem intuitiven Zugang zu einer möglichen Ursache gefragt, die auch nur als *Zusammenhang* bezeichnet wird. Der Therapeut spricht langsam und mit Pausen, wobei die längere Pause von 1.84 Sekunden auch einen *transition relevance place*, also einen Redeübergabe relevanten Ort darstellt, den der Patient aber wiederum nicht wahrnimmt. Der Konjunktiv *mag* wie auch das vage Indefinitpronomen *irgendne* verweisen ebenfalls auf eine vorsichtige Nachfrage. Dem Patienten wird dennoch schon allein durch die Frage selbst die epistemisch-kognitive Kompetenz zugeschrieben, sich am Erklärungsfindungsprozess beteiligen zu können. Im Fallbeispiel kommt es auch schließlich nach dispräferierter Reaktion des Patienten und längeren Ausführungen dazu, dass der Patient die mangelnde Aufmerksamkeit seines Vaters ihm gegenüber als möglichen Zusammenhang identifiziert.

Einen Zusammenhang oder gar eine Ursache zu identifizieren, gelingt nicht in allen Fällen der gemeinsamen Bearbeitung einer Frage zur kollaborativen Erklärungsfindung. Dies ist nicht verwunderlich, kommt der Patient ja in der Regel in die Therapie, weil er keine Erklärung für seine psychischen oder somatischen Beschwerden hat und genau dafür professionelle Hilfe sucht. Nichtsdestotrotz ist der Patient immer auch derjenige, der seine Symptome und Probleme am besten kennt und der Zugang für ihn zwar verschüttet sein mag, aber nicht prinzipiell unzugänglich ist. Zudem ist, gerade in einem psychodiagnostischen Erstinter-

view, auch die Ausprägung der Erklärungskompetenz von Patienten ein wichtiges Element der Diagnostik und des darauf aufbauenden Therapiefokus.

5.5.3 Lösungsorientierte Fragen

Mit Hilfe von *Lösungsorientierten Fragen* sollen im geschützten Raum des therapeutischen Settings Lösungen für Probleme und Konflikte des Patienten sowie Potenziale der Veränderung gesucht werden (Mack et al. 2016: 81; Spranz-Fogasy et al. 2018; Kabatnik et al. 2019). Gemeint sind Fragen wie *wo soll_s denn hingehn in der zukunft, was möchten sie denn machen* oder *wie hätten sie_s denn gerne*. Solche Fragen sind prospektiv und hypothetisch, da die zu diskutierenden Lösungsmöglichkeiten auf die Zukunft bezogen und erst noch zu realisieren sind.

In zwölf von fünfzehn Gesprächen des untersuchten Korpus von psychodiagnostischen Erstinterviews konnten 27 *Lösungsorientierte Fragen* identifiziert werden.¹⁸ *Lösungsorientierte Fragen* finden sich in diesen Gesprächen meist gegen Gesprächsende (18/27) oder zumindest am Ende komplexerer Themenbehandlung (9/27). Ihnen geht stets die Darstellung niedriger *agency*¹⁹ voraus, also der Thematisierung geringer Handlungsfähigkeit des Patienten in Bezug auf ein Problem oder einen Konflikt. Daran knüpfen *Lösungsorientierte Fragen* an und erschaffen gesprächslokal einen Spekulationsraum – gekennzeichnet durch konjunktivische und modale Ausdrücke sowie emotive, kognitive und volitionale Prädikate –, der einen mentalen wie verbalen Reflexionsprozess zu vorhandenen Lösungsvorstellungen ermöglicht. W- und V1-Frage-Format und die darin enthaltenen thematischen Vorgaben fokussieren das Problem, und der spezifische Adressatenzuschnitt von *Lösungsorientierten Fragen* – die stets explizite Adressierung trotz dyadischen Settings – setzen dem zuvor als handlungseingeschränkt charakterisierten Patienten implizit ein handlungsmächtiges Selbstbild entgegen. Mit einer *Lösungsorientierten Frage* sucht der Therapeut dann tatsächliche Lösungen aus der Sicht des Patienten zu ermitteln, und er kann zudem dessen Fähigkeit oder Unfähigkeit, Lösungen zu entwickeln, beobachten. Zugleich wird mit *Lösungsorientierten Fragen* aber auch Verantwortung an den Patienten übertragen, d. h., deutlich gemacht, dass nur er selbst für die Lösung

18 In zwei der Gespräche ohne *Lösungsorientierte Fragen* wurden Lösungsthemen auf andere Weise angesprochen, z. B. durch Spekulationen des Therapeuten oder auch von Patienten selbst. In einem anderen Gespräch verzichtet der Therapeut aufgrund der schweren Traumatisierung der Patientin und der Einmaligkeit des OPD-Interviews auf stärker interventive Handlungen.

19 Zu *agency* siehe Kook (2015), zu *agency* in *Lösungsorientierten Fragen* siehe Marciniak (2017).

seiner Probleme und Konflikte die notwendige epistemische Autorität und Handlungsmacht besitzt. Hier ein exemplarischer Ausschnitt dazu:²⁰

T3_2 (00:56:03)

- 1274 T das heißt sie wissen_s gar nicht
eigentlich wie man sich auch gut
streiten kann
1275 (0.38)
1276 P nee
1277 (1.82)
1278 T hmhm
1279 (2.32)
1280 P ((schmatzt)) gut streiten
1281 (0.75)
1282 T hmhm
1283 (1.87)
1284 P hm
1285 (1.26)
1286 T **hätten sie des vorstellen können
(.) wie des (.) so aussehen könnte
oder wie sie_s gerne hätten**
1287 (0.95)
1288 P mhmh
1289 (0.31)
1290 P wüsst ich gar nicht
1291 T (.) hmhm
1292 P (.) ja
1293 (0.6)
1294 T **und wenn sie_n bisschen
fantasieren würden**
1295 (2.15)
1296 P äh gut streiten
1297 (0.25)
1298 T hmhm
1299 (2.24)
1300 P ja ich denk gut streiten is
einfach ähm (.) °h
1301 (0.24)
1302 P sachlich zu bleiben einfach (.)
[äh in ner] gewissen tonlage zu
bleiben und da nich hinauszugehen
und einfach (.) °h des auszudiskutieren
1303 T [hmhm]
1304 (0.46)
1305 P und dann natürlich_n nenner zu
finden

Vor dem hier zitierten Ausschnitt hatte die Patientin berichtet, dass sie aufgrund ihrer früheren Erfahrungen mit Auseinandersetzungen ihrer Eltern Konfliktsi-

20 Der Ausschnitt wird ausführlicher analysiert in Marciniak (2017), Reinicke (2018), Spranz-Fogasy et al. (2018), Kabatnik et al. (2019).

tuationen mit ihr Nahestehenden meidet. Der Therapeut fasst diese Darstellung dann mittels einer *rephrasing formulation*: *das heißt sie wissen_s gar nicht eigentlich wie man sich auch gut streiten kann* als Unfähigkeit der Patientin, zu streiten, zusammen. Dies bestätigt die Patientin, übernimmt aber nicht das Rederecht zu weiteren Ausführungen. Die folgende *Lösungsorientierte Frage* des Therapeuten fragt zunächst auf der kognitiven Ebene nach ›Vorstellungen‹ der Patientin über gutes Streiten und unmittelbar daran anschließend auf der emotionalen Ebene nach ihren Wünschen dazu (*oder wie sie_s gerne hätten*). Die dispräferierte, generalisierte abwehrende Reaktion der Patientin (*wüsst ich gar nicht* [S 1290]) sucht der Therapeut dann mit einer insistierenden *Lösungsorientierten Frage* (*und wenn sie n bisschen fantasieren würden* [S 1294]) aufzubrechen, was ihm auch tatsächlich gelingt: Die Patientin ist im Folgenden erkennbar in der Lage, ein sehr elaboriertes Konzept von gutem Streiten darzustellen.

Auf *Lösungsorientierte Fragen* folgen in unseren Daten immer dispräferierte Reaktionen, was mit der vorausgehenden Darstellung reduzierter *agency* zusammenhängen mag. Insistenz des Therapeuten führt dann aber regelmäßig zu optimierten Antworten, in denen doch Vorstellungen des Patienten zu seiner Zukunft, zu Therapiezielen oder zu Problem- und Konfliktlösungen deutlich werden. Läßle et al. (under review) haben drei Typen des Widerstandsmanagements von Therapeuten infolge dispräferierter Reaktionen auf *Lösungsorientierte Fragen* identifiziert: Die Aufforderung an den Patienten, seine Antwort zu elaborieren (*Expansionsinitiierung*), die Qualifizierung der Patientenreaktion als problematisch oder unzureichend (*Reparaturinitiierung*) und den *Themenwechsel*. Abgesehen vom Typus *Themenwechsel* gestaltet sich dann ein weiterer Sequenzschritt so, dass der Patient seine Darstellungen expandiert, dem Therapeuten zustimmt oder ihm widerspricht (was zu einer weiteren Runde führt) oder, in den meisten Fällen, eine optimierte Antwort liefert. Die gesamte Sequenz gestaltet sich dann so:

- 0-Position Anknüpfungspunkte: Darstellungen niedriger *agency* (durch P oder T)
- 1-Position *Lösungsorientierte Frage* (T)
- 2-Position Bearbeitung der *Lösungsorientierten Frage*: präferiert/dispräferiert (P)
 (*non-answer, answer-like, partiell konform*)
- 3-Position Expansionsinitiierung/Reparaturinitiierung/Themenwechsel (T)
- (4-Position Zustimmung/Expansion/Widerstand/optimierte Antwort (P))

Abbildung 1: Sequenzorganisationsmodell der Lösungsorientierten Fragen nach Läßle et al. (under review).

Diese bisherigen Analysen *Lösungsorientierter Fragen* lassen darauf schließen, dass kommunikativer Widerstand nach *Lösungsorientierten Fragen* in den meisten Fällen konstruktiv aufgegriffen wird und Therapeuten auf abweichende Relevanzsetzungen und Agenden vorzugsweise in neutraler oder affiliativer Art und Weise reagieren, um die Gesprächsprogression sowie die therapeutische Allianz aufrechtzuerhalten. Die *Lösungsorientierten Fragen* selbst sind bereits in therapeutischer Hinsicht wirksam, als sie Möglichkeiten aufzeigen, handlungsmächtig zu werden und den Patienten zwingen, Verantwortung für sich zu übernehmen.

6 Diskussion

Fragen sind ein wichtiges Instrument der Psychotherapie und -diagnostik. Ihre grundlegenden und allgemeinen Funktionen sind Referenzklärung, Themenwechsel, direkte Ansprache und Agenda-Setting (siehe Mack et al. 2016: 50). Fragen elizitieren Information, sie stoßen Reflexion und damit auch Veränderungsprozesse an, sie sind ein wesentlicher Bestandteil therapeutischer Wirksamkeit, die auf sequenziellen Zwängen beruht, die beide Partner einbindet – ihre Antwortverpflichtung stellt einen wichtigen Baustein zur Konstitution von Intersubjektivität dar, auf deren Grundlage sich therapeutische Agenden und Foki erst entwickeln lassen.

Die hier vorgestellten Frage-Funktionstypen bilden in ihrer Gesamtheit ein breites Instrumentarium, mit dem nicht nur Wissen eliziert werden kann, sondern auch Wahrnehmungs- und Handlungsmuster erkennbar werden und Beziehungen hergestellt und vertieft werden können. Sie bilden zusammen eine aufbauende und Gerüst gebende innere Systematik i. S. von *scaffolding practices* (Muntigl und Horvath 2008).

Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich auf die Diskussion der zuletzt aufgeführten drei Frage-Funktionstypen. Die zuvor dargestellten vier Fragetypen, die qua Übertragung der in der konversationsanalytischen Forschung identifizierten Funktionstypen von *formulations* ermittelt wurden, dienen, wie *formulations* auch, vor allem der Exploration der Symptome und der Biografie des Patienten. Dabei fokussiert der Therapeut immer die subjektive Erlebensebene, die in den Darstellungen des Patienten impliziert oder auch explizit formuliert ist und steigert mit den genannten Fragetypen seine eigene Beteiligung von hervorhebend/ausblendend (*highlighting questions*) über die Interpretation (ggf. nur vermeintlicher) Implikationen (*rephrasing questions*) und die Verknüpfung von Darstellungen zu einem potenziellen (Wahrneh-

mungs-/Handlungs)Muster (*relocating questions*) bis zur Übersteigerung von Patientendarstellungen (*exaggerating questions*).²¹

Die drei Fragetypen, die ich hier ausführlicher behandelt habe, also *Beispiel-Nachfragen*, *Fragen zur kollaborativen Erklärungsfindung* und *Lösungsorientierte Fragen*, geben einen Hinweis auf einen möglichen Zusammenhang. Sie zielen auf das gegenwärtige Erleben des Patienten und seine Wahrnehmungs- und Handlungsmuster, auf deren Herkunft aus vergangenen Ereignissen und Erfahrungen und auf seine Möglichkeiten, sich auf Zukunft zu entwerfen. Beim gemeinsamen Durcharbeiten dieser die ganze Zeitlichkeit um- und erschließenden Fragen wird es möglich, alternative Sicht- und Handlungsweisen zu entwickeln und Wege zu ermitteln, um sie in das Leben des Patienten zu integrieren.

Die Voraussetzungen bzw. die Kontexte, in denen die drei Fragetypen virulent werden, sind dabei jeweils andere. Für *Beispiel-Nachfragen* sind es defizitäre, weil nur sachliche Beschreibungen psycho-implikativer Ereignisse und das Ausweichen auf unklare, vage oder zu allgemeine Darstellungen nach erfolgter Fokussierung auf die Erlebensebene durch eine Aufforderung mit *Rephrasing*-Charakter. *Fragen zur kollaborativen Erklärungsfindung* folgen auf eine erfolgreiche bzw. mindestens ausreichende Identifikation von für den Patienten musterhaften Problemkomplexen bzgl. seines Situationshandelns und -erlebens. Und für *Lösungsorientierte Fragen* ist der Ausgangspunkt stets die Thematisierung niedriger *agency* des Patienten.

Bei *Beispiel-Nachfragen* befinden sich die Beteiligten noch in der Aushandlung eines Problems oder Konflikts, bei *Fragen zur kollaborativen Erklärungsfindung* und *Lösungsorientierten Fragen* ist diese Aushandlung jeweils an einen (möglicherweise auch nur vorläufigen) Endpunkt gelangt. *Beispiel-Nachfragen* dienen dann der Aufklärung von Problemen und Konflikten, *Fragen zur kollaborativen Erklärungsfindung* suchen eine Erklärung dafür und *Lösungsorientierte Fragen* eine Lösung. Diese therapeutischen Handlungen gehen also über das bloße Ermitteln von Symptomen und Problemen hinaus. Die Bearbeitung der Fragen macht den Patienten dann zum Aufklärer und vielfach auch ausdrücklich zum (Mit-)Behandler seiner selbst. Außerdem bieten die Reaktionen von Patienten dem Therapeuten Zugriff auf biografische Informationen, aber auch auf erzählte und in der Interaktion zum Ausdruck kommende Wahrnehmungs-, Handlungs- und Beziehungsmuster.

Die vielfältigen widerständigen Reaktionen von Patienten auf die genannten drei Fragetypen sind dabei auffällig. Bei *Beispiel-Nachfragen*, die in ca. zwei

21 Vertiefende Darstellungen zu den genannten Funktionstypen finden sich in Mack et al. (2016); darin und in der dort zitierten Literatur auch zu den äquivalenten Funktionstypen von *formulations*.

Drittel ihres Vorkommens dispräferierte Reaktionen des Patienten nach sich ziehen, ist die vorausgehende ausschließliche Sachbezogenheit und die Vagheit des Patienten ein Hinweis darauf, dass problematische Themen verhandelt werden, denen sich der Patient lieber nicht nähern möchte. Hinzukommen können aber natürlich auch Erinnerungs- und damit verbundene Formulierungsschwierigkeiten. *Fragen zur kollaborativen Erklärungsfindung* folgen in etwa der Hälfte der Fälle dispräferierte Reaktionen. Hier spielt sicher eine Grundvoraussetzung von Psychotherapie eine wichtige Rolle: Der Patient ist ja in Behandlung, weil er Leidensdruck hat und sich die Gründe dafür nicht erklären kann – das hypothetisch-offene Interaktions-Setting erlaubt demgegenüber aber doch auch Freiheiten zu ungeschützten Spekulationen. Bei *Lösungsorientierten Fragen*, denen in allen Fällen unseres Korpus dispräferiert begegnet wird, bildet die Thematisierung niedriger *agency* des Patienten (wie auch insbesondere das Krankheitsbild der Depression) im Vorfeld einen starken Auslöser dafür, dass Patienten zunächst gar keine Perspektiven entwickeln können. Der Therapeut hatte aber bei allen drei Fragetypen die Möglichkeit, durch Insistieren doch noch eine optimierte Antwortreaktion zu erreichen.

Die eingangs zitierten Erkenntnisse Köllers (2004: 662) hinsichtlich der interaktiven und kognitiven Potenziale von Fragen werden insbesondere bei den drei hier fokussierten Frage-Funktionstypen sichtbar. Die Einleitung »hypothetischer Vorstellungsprozesse« ist in besonderer Weise adäquat für die sensible Interaktionssituation psychotherapeutischer Gespräche, und der »immanente[n] Tendenz [...] in Selbstreflexionsprozesse überzugehen« entspricht der mit den Fragen einhergehende Handlungsauftrag an den Patienten. Wissensdefizite auch vergessener, verborgener und gar unbewusster Natur können lokalisiert und behoben werden, Wissensbedürfnisse thematisiert und »Ursachen und Funktionen« fokussiert werden, indem »Bezüge zur Vergangenheit sowie Zukunft« hergestellt werden. Die in Fragen enthaltenen Erfahrungen bieten dann auch die Grundlage für neue Erfahrungen, weil sie »einen Wechsel von Sehepunkten und Wahrnehmungsperspektiven«, beispielsweise vom Symptom zur Ursache bei *Fragen zur kollaborativen Erklärungsfindung* oder von der Gegenwart und Vergangenheit zur Zukunft wie bei *Lösungsorientierten Fragen*, beinhalten. Sehepunkte und Wahrnehmungsperspektiven zu wechseln oder wechseln zu lernen ist geradezu die interaktionale Rationale psychotherapeutischer Gespräche, und Fragen sind dazu das Mittel par excellence.

Literatur

- Arbeitskreis OPD (Hg.). 2014. *Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik OPD-2: Das Manual für Diagnostik und Therapieplanung*, 3. überarb. Aufl. Bern: Huber.
- Bilmes, Jack. 2015. *The structure of meaning in talk: Explorations in category analysis*: Bd. 1: *Co-categorization, contrast, and hierarchy*. http://www2.hawaii.edu/~bilmes/structure_of_meaning.pdf (Abruf am 13. Mai 2019).
- Blöcher, Jessica. 2017. *Implizite Beispiel-Nachfragen im psychodiagnostischen Gespräch*. Universität Mannheim: Masterarbeit.
- Boyd, Elizabeth & John Heritage. 2006. Taking the history: Questioning during comprehensive history-taking. In John Heritage & Douglas W. Maynard (Hgg.), *Communication in medical care: Interaction between primary care physicians and patients*, 151–184. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bröcher, Leonie. 2017. *Lösungsorientierte Fragen in psychodiagnostischen Gesprächen: Die Funktionen der Testung, impliziter Kritik und Ermittlung tatsächlicher Lösungsmöglichkeiten*. Universität Mannheim: Masterarbeit.
- Deppermann, Arnulf. 2008. *Gespräche analysieren: Eine Einführung*. Wiesbaden: VS.
- Deppermann, Arnulf. 2018. Wissen im Gespräch. In Karin Birkner & Nina Janich (Hgg.), *Handbuch Text und Gespräch* (Handbücher Sprachwissen 5), 104–142. Berlin & Boston: de Gruyter.
- Fischer, Madelaine. 2017. *Modalpartikeln in Therapiegesprächen: Die Modalpartikeln »halt« und »eben« in OPD-Gesprächen*. Universität Mannheim: Masterarbeit.
- Flader, Dieter. 1978. Die psychoanalytische Therapie als Gegenstand sprachwissenschaftlicher Forschung. *Studium Linguistik* 5(2). 77–80.
- Flader, Dieter. 1982. Die psychoanalytische Deutung: Eine diskurslinguistische Fallstudie. In Dieter Flader, Wolf-Dietrich Grodzicki & Klaus Schröter (Hgg.), *Psychoanalyse als Gespräch: Interaktionsanalytische Untersuchungen über Therapie und Supervision*, 138–193. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Fofana, Gundula. 2016. *»Psychotherability« in psychodiagnostischen Gesprächen. Kommunikative Verfahren zur Darstellung von Handlungsbedürftigkeit und Behandlungseignung*. Universität Mannheim: Masterarbeit.
- Freud, Sigmund & Josef Breuer. 1895. *Studien über Hysterie*. Leipzig & Wien: Franz Deuticke.
- Graf, Eva-Maria & Thomas Spranz-Fogasy. 2018. Welche Frage, wann und warum? Eine qualitativ-linguistische Programmatik zur Erforschung von Frage-Sequenzen als zentrale Veränderungspraktik im Coaching. *Coaching Theorie & Praxis*. DOI: 10.1365/s40896-018-0021-4 (Abruf am 07. November 2018).
- Halkowski, Timothy. 2006. Realizing the illness: Patients' narratives of symptom discovery. In John Heritage & Douglas W. Maynard (Hgg.), *Communication in medical care: Interaction between primary care physicians and patients*, 86–114. Cambridge: Cambridge University Press.
- Heritage, John. 2010. Questioning in medicine. In Alice Freed & Susan Ehrlich (Hgg.), *Why do you ask? The function of questions in institutional discourse*, 42–68. Oxford: Oxford University Press.
- Heritage, John & Jeffery Robinson. 2006. Accounting for the visit: Giving reasons for seeking medical care. In John Heritage & Douglas W. Maynard (Hgg.), *Communication*

- in medical care: Interaction between primary care physicians and patients*, 48–85. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kabatnik, Susanne, Christoph Nikendei, Johannes C. Ehrenthal & Thomas Spranz-Fogasy. 2019. The Power of LoF: Veränderung durch Lösungsorientierte Fragen im psychotherapeutischen Gespräch. In Eva-Maria Graf, Claudio Scarvaglieri & Thomas Spranz-Fogasy (Hgg.), *Pragmatik der Veränderung: Problem- und lösungsorientierte Kommunikation in helfenden Berufen*, 147–175. Tübingen: Narr.
- Kallmeyer, Werner & Fritz Schütze. 1977. Zur Konstitution von Kommunikationsschemata der Sachverhaltsdarstellung. In Dirk Wegener (Hg.), *Gesprächsanalysen* (Forschungsberichte des Instituts für Kommunikationsforschung und Phonetik der Universität Bonn 65), 159–274. Hamburg: Helmut Buske.
- Koerfer, Armin & Christoph Neumann. 1982. Alltagsdiskurs und psychoanalytischer Diskurs: Aspekte der Sozialisierung des Patienten in einem »ungewohnten« Diskurstyp. In Dieter Flader, Wolf-Dietrich Grodzicki & Klaus Schröter (Hgg.), *Psychoanalyse als Gespräch: Interaktionsanalytische Untersuchungen über Therapie und Supervision*, 96–137. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Köller, Wilhelm. 2004. *Perspektivität auf Sprache: Zur Struktur von Objektivierungsformen in Bildern, im Denken und in der Sprache*. Berlin: De Gruyter.
- Konerding, Klaus-Peter. 2015. Heilung durch Sprache und Sprechen: Linguistik und Psychotherapie. In Albert Busch & Thomas Spranz-Fogasy (Hgg.), *Handbuch Sprache in der Medizin* (Handbücher Sprachwissen 11), 225–242. Berlin: de Gruyter.
- Kook, Jiyeon. 2015. *Agency in Arzt-Patient-Gesprächen*. Bern: Peter Lang.
- Labov, William & David Fanshel. 1977. *Therapeutic discourse: Psychotherapy as conversation*. New York: Academic Press.
- Läpple, Sina, Christoph Nikendei & Thomas Spranz-Fogasy. Under review. *Therapeutische Reaktionen auf Patientenwiderstand in psychodiagnostischen Gesprächen: Am Beispiel Lösungsorientierter Fragen*.
- Mack, Christina, Christoph Nikendei, Johannes C. Ehrenthal & Thomas Spranz-Fogasy. 2016. »[...] hab ich glaub ich die richtigen fragen gestellt«: Therapeutische Fragehandlungen in psychodiagnostischen Gesprächen. *OPAL* 7(3). 1–98.
- MacMartin, Clare. 2008. Resisting optimistic questions in narrative and solution-focused therapy. In Anssi Peräkylä, Charles Antaki, Sanna Vehviläinen & Ivan Leudar (Hgg.), *Coversation analysis and psychotherapy*, 80–99. Cambridge: Cambridge University Press.
- Marciniak, Agnieszka. 2017. *Agency in Lösungsorientierten Fragen im Psychodiagnostischen Gespräch*. Universität Mannheim: Masterarbeit.
- Münster, Svenja. 2015. *Relevanzmarkierungen in operational-psychodynamischen Diagnosegesprächen: Eine linguistisch-gesprächsanalytische Untersuchung*. Universität Heidelberg: BA-Arbeit.
- Muntigl, Peter & Adam Horvath. 2005. Language, psychotherapie and client change: An interdisciplinary perspective. In Paul Chilton & Ruth Wodak (Hgg.), *A new agenda in (critical) discourse analysis: Theory, methodology and interdisciplinarity* (Discourse approaches to politics, society and culture 13), 213–239. Amsterdam: Benjamins.
- Oelschläger, Eileen. 2017. *Lösungsorientierte Fragen in psychodiagnostischen Gesprächen: Testen, Übertragen der Verantwortung und implizite Kritik*. Universität Mannheim: Masterarbeit.

- Peräkylä, Anssi. 2013. Conversation analysis in psychotherapy. In Jack Sidnell & Tanya Stivers (Hgg.), *The handbook of conversation analysis* (Blackwell handbooks in linguistics), 551–574. Chichester: Wiley-Blackwell.
- Peräkylä, Anssi, Charles Antaki, Sanna Vehviläinen & Ivan Leudar. 2008. Analysing psychotherapy in practice. In Anssi Peräkylä, Charles Antaki, Sanna Vehviläinen & Ivan Leudar (Hgg.), *Conversation analysis and psychotherapy*, 5–25. Cambridge: Cambridge University Press.
- Peräkylä, Anssi, Charles Antaki, Sanna Vehviläinen & Ivan Leudar (Hgg.). 2008. *Conversation analysis and psychotherapy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pittenger, Robert, Charles Hockett & John Danehy. 1961. *The first five minutes: A sample of microscopic interview analysis*. Ithaca New York: Martineau.
- Pomerantz, Anita & John Heritage. 2013. Preference. In Jack Sidnell & Tanya Stivers (Hgg.), *The handbook of conversation analysis* (Blackwell handbooks in linguistics), 210–228. Chichester: Wiley-Blackwell.
- Reinicke, Rebecca. 2018. *Emotive und kognitive Verben in Lösungsorientierten Fragen in psychodiagnostischen Gesprächen*. Universität Mannheim: Masterarbeit.
- Rettig, Heike. 2014. *Zum Beispiel: Beispielerverwendung in der verbalen Interaktion*. Heidelberg: Winter.
- Scarvaglieri, Claudio. 2013. *Nichts anderes als ein Austausch von Worten: Sprachliches Handeln in der Psychotherapie*. Berlin: de Gruyter.
- Schedl, Evi, Christoph Nikendei, Johannes C. Ehrenthal & Thomas Spranz-Fogasy. 2018. *Vages Sprechen in psychotherapeutischen Diagnosegesprächen: Eine gesprächsanalytische Untersuchung*. Göttingen: Verlag für Gesprächsforschung. <http://verlag-gespraechsforschung.de/2018/schedl.html> (Abruf am 13. Mai 2019).
- Schefflen, Albert. 1973. *Communicational structure: Analysis of a psychotherapy transaction*. Bloomington: Indiana University Press.
- Schegloff, Emanuel. 2007. *Sequence organization in interaction: A primer in Conversation Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Selting, Margret et al. 2009. Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem 2 (GAT 2). *Gesprächsforschung* 10. 353–402. <http://www.gespraechsforschung-online.de/fileadmin/dateien/heft2009/px-gat2.pdf> (Abruf am 30. Oktober 2018).
- Siebeking-Thompson, Miriam. 2017. *Kollaborative Erklärungsfindungsfragen in Psychotherapiegesprächen*. Universität Mannheim: Masterarbeit.
- Spranz-Fogasy, Thomas. 1986. »widersprechen«: Zu Form und Funktion eines Aktivitätstyps in Schlichtungsgesprächen: Eine gesprächsanalytische Untersuchung (Forschungsberichte des Instituts für deutsche Sprache 62). Tübingen: Narr.
- Spranz-Fogasy, Thomas. 2010. Verstehensdokumentation in der medizinischen Kommunikation: Fragen und Antworten im Arzt-Patient-Gespräch. In Arnulf Deppermann, Ulrich Reitemeier, Reinhold Schmitt & Thomas Spranz-Fogasy (Hgg.), *Verstehen in professionellen Handlungsfeldern* (Studien zur Deutschen Sprache 52), 27–116. Tübingen: Narr.
- Spranz-Fogasy, Thomas, Susanne Kabatnik & Christoph Nikendei. (2018). Wissenskonstitution durch Lösungsorientierte Fragen in psychodiagnostischen Gesprächen. In Ernest W. B. Hess-Lüttich (Hg.), *Jahrbuch Rhetorik und Medizin* (Rhetorik 37), 111–133. Berlin & Boston: de Gruyter.

- Spranz-Fogasy, Thomas, Eva-Maria Graf, Johannes C. Ehrenthal & Christoph Nikendei. 2019. Beispiel-Nachfragen im Kontext von Veränderung: Elizitierungs- und Prozessierungsstrategien in Psychotherapie und Coaching-Gesprächen: Ein Vergleich. In Eva-Maria Graf, Claudio Scarvaglieri & Thomas Spranz-Fogasy (Hgg.), *Pragmatik der Veränderung: Problem- und lösungsorientierte Kommunikation in helfenden Berufen*, 177–207. Tübingen: Narr.
- Spranz-Fogasy, Thomas, Eva-Maria Graf, Christoph Nikendei & Johannes C. Ehrenthal. Im Druck. Requesting examples in psychodiagnostic interviews: Therapists' contribution to the sequential co-construction of clients' change. In Joanna Pawelczyk & Eva-Maria Graf (Hgg.), *Understanding change in helping professions*. Special Issue for *Communication & Medicine*.
- Stivers, Tanya & Makoto Hayashi. 2010. Transformative answers: One way to resist a question's constraints. *Language in Society* 39(1). 1–25.
- Stremlau, Philipp. 2017. *Kommunikative Praktiken des Widerstands in psychotherapeutischen Gesprächen: Patientenwiderstand durch reaktive Ich-weiß-nicht-Konstruktionen*. Universitäten Mannheim & Waterloo: Masterarbeit.
- Vehviläinen, Sanna, Anssi Peräkylä, Charles Antaki & Ivan Leudar. 2008. A Review of Conversational Practices of Psychotherapy. In Anssi Peräkylä, Charles Antaki, Sanna Vehviläinen & Ivan Leudar (Hgg.), *Conversation analysis and psychotherapy*, 188–197. Cambridge: Cambridge University Press.
- Voutilainen, Liisa & Anssi Peräkylä. 2016. Interactional Practices of Psychotherapy. In: O'Reily, Michelle/Jessica Lester, Jessica (Hg.) *The Palgrave Handbook of Adult Mental Health*, 540–557. Houndmills: Palgrave Macmillan.
- Voutilainen, Liisa, Anssi Peräkylä & Johanna Ruusuvuori. 2011. Therapeutic change in interaction: Conversation analysis of a transforming sequence. *Psychotherapy Research* 21(3). 348–365.
- Voutilainen, Liisa, Federico Rossano & Anssi Peräkylä. 2018. Conversation Analysis and Psychotherapeutic Change. In Simona Pekarek Doehler, Johannes Wagner & Esther González-Martínez. (Hgg.), *Documenting change across time: Longitudinal studies on the organization of social interaction*, 225–254. London: Palgrave Macmillan.
- Weiste, Elina & Anssi Peräkylä. 2013. A comparative conversation analytic study of formulations in psychoanalysis and cognitive psychotherapy. *Research on Language and Social Interaction* 51(4). 299–321.
- Weiste, Elina & Anssi Peräkylä. 2015. Therapeutic discourse. In Karen Tracy (Hg.), *The international encyclopedia of language and social interaction* (The Wiley-Blackwell-ICA International encyclopedias of communication), 1–10. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Weiste, Elina, Liisa Voutilainen & Anssi Peräkylä. 2016. Epistemic asymmetries in psychotherapy interaction: Therapists' practices for displaying access to clients' inner experiences. *Sociology of Health & Illness* 38(4). 645–661.